

Un exemplaire ♂ étiqueté sous ce nom dans la collection du Muséum de Paris, par M. LAMEERE. Un autre de ma collection. — La description détaillée et la figure de cette magnifique espèce paraîtront dans les *Annales* avec celles dont les diagnoses figurent dans le *Bulletin* [1912] n° 4.

### Description d'un Asidide nouveau de Madagascar

[COL. TENEBRIONIDAE]

par J. CHATANAY.

**Andreminus planatus**, n. sp. (fig. 1). — Noir, mais presque en entier recouvert de squamules gris-brunâtre masquant la couleur foncière, et souvent en outre d'un enduit terreux. Dessus à peu près glabre; seuls, le bord antérieur de l'épistome et le bord postérieur du thorax, au-dessus de l'écusson, ciliés. Dessous et pattes à pubescence couchée, gris brunâtre.

Tête transverse, inégale, concave en dessus, engagée dans le pronotum jusqu'aux yeux qui sont petits et peu visibles; trois fossettes sur le front. Antennes grêles, sétosellées, à art. 1 assez gros, 2 très petit, 3 allongé, presque cylindrique, 4 à 9 obconiques, diminuant graduellement de longueur, 10 conique, aussi large que long, 11 court, subglobuleux, à moitié encastré dans le 10°. Formule :  $2 + 1 + 3 + 2 + 1,9 + 1,8 + 1,7 + 1,6 + 1,5 + 1,5 + 1$  (fig. 2).




Fig. 1. — *Andreminus planatus* Chatanay.

Pronotum un peu plus (♀) ou aussi (♂) large que long, concave d'un bord à l'autre, non rebordé; inégal, mais sans relief bien marqué; avec sur le quart postérieur un sillon médian plus ou moins net, quelquefois très légèrement marqué aussi en avant; angles antérieurs aigus, un peu arrondis à l'extrémité; côtés élargis presque en ligne

droite de ces angles au milieu, puis rétrécis et sinués vers la base; celle-ci trisinuée, presque aussi large que celle des élytres; angles postérieurs bien marqués, un peu prolongés en arrière.

Élytres longs, lobés aux quatre cinquièmes postérieurs où leur largeur est maxima; ridés irrégulièrement sur le disque; concaves en dessus, relevés et carénés latéralement, et portant deux côtes principales : une voisine de l'écusson, courte, arquée; une deuxième se détachant un peu en dessous de l'épaule de la carène latérale et traversant obliquement le disque pour se terminer aux deux tiers de l'élytre par un relief aigu: des traces d'une 3<sup>e</sup> côte, se détachant en dedans de la 1<sup>re</sup> et rejoignant ce relief, sont plus ou moins visibles, surtout chez le ♂.



Fig. 2. — Antenne d'*Andre-mius planatus* Chatanay.

Faux épipleures nus, sans squamules sauf une bande longeant leur bord externe.

Tibias ciliés-spinuleux, les antérieurs munis d'un éperon apical externe court et fort, et de deux éperons internes, inégaux; les postérieurs arqués, vus de côtés (fig. 3).

Taille : 20-22 mill.

Madagascar : Vohémar. 1 ♂, 1 ♀ (ma collection).




Fig. 3. — Tibias antérieur et postérieur d'*Andre-mius planatus* Chatanay.

Cette espèce est voisine d'*A. crispatus* Fairm., type du genre et seule espèce décrite jusqu'ici (types : 1 ♂, 1 ♀ in collection du Muséum de Paris). On peut l'en distinguer très facilement aux caractères suivants :

1. Pronotum à base bien plus étroite que celle des élytres, à côtés sinués, une fois au quart antérieur,

une fois au quart postérieur environ. Reliefs prothoraciques bien marqués, ceux des élytres très accusés.

1. *crispatus* Fairm.

- Pronotum presque aussi large à la base que les élytres, inégal, sans reliefs bien marqués; à côtés arqués régulièrement des angles antérieurs au tiers postérieur, où ils sont faiblement sinués. Reliefs des élytres moins marqués..... 2. *planatus* Chatanay.

La collection du Muséum (coll. FAIRMAIRE) contient en outre sous le nom de *crisulatus* Fairm. un *Andre-mius* ♂ qui ne paraît pas distinct du *crispatus*. Outre les deux types, j'ai vu un certain nombre d'exemplaires du *planatus* dans la collection LE MOULT.